

# КАЛЕНДАР ЩЕПЛЕНИЯ

Українська

## ВАКЦИНАЦІЯ ВІК

Вакцинацію слід проводити якомога раніше.

Доцільно перевіряти статус вакцинації у будь-якому віці. Пропущені щеплення необхідно негайно заповнювати згідно з рекомендаціями для відповідного віку.

Рекомендації постійної комісії з  
вакцинації (STIKO), 2022 р. [www.stiko.de](http://www.stiko.de)

ROBERT KOCH INSTITUT



	У тижнях															У місяцях															У роках														
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	c 18	c 60	U4	U5	U6	U7	U7a/U8	U9	U10	U11/1	J2																		

Ротавіруси	G1 <sup>a</sup>															G2 (G3)														
	G1	N	G2	N	G3	N	A1	N	A2	N	A	e																		
Правець	G1	N	G2	N	G3	c																								
Дифтерія	G1	N	G2	N	G3	c																								
Судомний кашель Коклюш	G1	N	G2	N	G3	c																								
Гемофільна інфекція інфекція <i>Tup b</i>	G1	N	G2	N	G3	c																								
Дитячий параліч <sup>b</sup> Поліоміеліт	G1	N	G2	N	G3	c																								
Гепатит В	G1	N	G2	N	G3	c																								
Пневмокок	G1	N	G2	N	G3	c																								
Менінгокок С					G1																									
Kip					G1																									
Свинка, краснуха					G1																									
Вітрянка Вітряна віспа					G1																									
ВПЛ Вірус папіломи людини					G1																									
Оперізуючий герпес																														
Грип Інфлюенца																														

## ПОЯСНЕННЯ

**G** БАЗОВА ІМУНІЗАЦІЯ (до 3-х часткових щеплень G1 - G3)

**S** СТАНДАРТНА ВАКЦИНАЦІЯ

**A** РЕВАКЦИНАЦІЯ

**N** ПОСЛІДУЮЧА ВАКЦИНАЦІЯ (базова імунізація всіх ще не вакцинованих або Завершення неповної серії вакцинації)

**U** Скринінгове обстеження

**J** Обстеження підлітків (J1 у віці 12–14 років)

**a** Перша доза вакцини з 6-тижневого віку, залежно від вакцини, 2-а чи 3-я доза вакцини з інтервалом не менш 4 тижнів.

**b** Недоношені діти: додаткова доза вакцини у віці 3 місяців, тобто лише 4 дози вакцини.

**c** Мінімальний інтервал від попередньої дози: 6 місяців.

**d** Дві дози вакцини з інтервалом не менше 5 місяців, з додатковою вакцинацією, починаючи від 15 років або з інтервалом між вакцинаціями менше 5 місяців між 1-ою та 2-ою дозами. Потрібна 3-я доза.

**e** Ревакцинація Td (проти правця й дифтерії) кожні 10 років. Наступна обов'язкова вакцинація Td - разова вакцинація як Tdap (проти правця, дифтерії, коклюшу) або, за наявності показань, комбінована вакцинація Tdap-IPV (проти правця, дифтерії, коклюшу й поліоміеліту).

**f** Разова вакцинація вакциною MMR (проти кору, свинки, краснухи) для всіх осіб, що народилися після 1970 р. ≥ 18 років з неясним статусом щеплення, без щеплення або тільки з одним щепленням у дитинстві.

**g** Вакцинація 23-валентною полісахаридною вакциною.

**h** Дворазова вакцинація ад'ювантною вакциною проти оперізувального герпесу (інактивованою вакциною) з інтервалом від 2 до 6 місяців.

\* Вакцинацію можна робити в кілька прийомів. MMR (проти кору, свинки, краснухи) та V можна призначати на один день або з інтервалом у 4 тижні.

Терміни наступної  
вакцинації

